

Nitidulides nouveaux du British Museum [COL.]

par A. GROUVELLE.

Platychorinus, nov. gen. — *Processus prosternalis coxas anticas superans, ad apicem dilatatus. Labrum magnum, profunde bilobum. Sulci antennarum convergentes. Antennae sat elongatae; clava oblonga, haud compacta. Mandibulae simplices. Palpi maxillares filiformes; ultimum articulum palporum labiarum oblongum, subincrassatum. Elytra ultimum segmentum abdominis haud obtegentia. Tibiae dilatatae, compressae. Tarsi dilatati; unguiculis haud dentatis. Mesosternum haud carinatum.*

Nouveau genre voisin des *Aethina*, faisant la transition entre ces insectes et les *Epuraca*. Il faut rapporter à ce genre *Mystrops dubius* Group. (*Rev. franç. d'Ent.* [1903], p. 173).

Pl. dilutus, nov. sp. — *Ovatus, sat latus, subdepressus, nitidulus, flavo griseo-pubescent, ochraceo-piceus, capite elytrisque dilutioribus; capite transverso, alutaceo, parce punctato, antice biimpresso et truncato; prothorace transverso, antice quam postice angustiore, sat dense punctato, alutaceo, margine antico late emarginato, lateribus rotundatis, tenuiter marginatis, basi utrinque ad extremitates breviter subsinuate, angulis anticis rotundatis, posticis obtusis, rix hebetatis, scutello subtriangulati, dense punctulato; elytris tam elongatis, quam simul latis, ad apicem oblique truncatis, ultimum segmentum abdominis non obtegentibus, minus fortiter punctatis quam prothorace, lateribus haud stricte emarginatis, infuscatis; pygidio triangulati, convexiusculo, dense punctato.* — Long. : 1,75-2,5 mill.

Ovale, assez large, à peine convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence d'un flave cendré, jaune de poix; tête, antennes, élytres et pattes plus claires. Tête transversale, éparsément ponctuée, alutacée, bi-impressionnée entre les bases des antennes; épistome tronqué. Prothorax à peine rétréci à la base, plus fortement au sommet, environ deux fois aussi large dans sa plus grande largeur que long, assez densément ponctué, alutacé; sommet largement échancré; côtés arrondis, étroitement rebordés; base subtronquée dans le milieu, légèrement sinuée et très finement rebordée de chaque côté vers les extrémités; angles antérieurs arrondis, postérieurs obtus, à peine émoussés. Écusson en triangle, un peu curviligne, densément pointillé. Élytres légèrement atténués vers le sommet, environ aussi longs que

larges ensemble, tronqués obliquement au sommet, laissant à découvert le dernier segment de l'abdomen, alutacés, couvertes d'une ponctuation un peu moins forte et un peu moins dense que celle du prothorax; marges latérales un peu rembrunies, rebordées. Pygidium triangulaire, un peu convexe, densément ponctué. Pygidium du mâle tronqué au sommet, terminé par un petit segment supplémentaire qui complète la forme triangulaire.

Ile Damma (collection du British Museum).

Meligethinus, nov. gen. — *Processus prosternalis coxas anticas superans, ad apicem dilatatus. Labrum parvum, vix conspicuum. Sulci antennarum convergentes. Mandibulae simplices. Antennae elongatae, clava haud compacta. Elytra ultimum segmentum abdominis haud obtegentia. Tibiae anticae dilatae, extus dentatae. Tarsi dilatati. Ultimum segmentum abdominis utrinque foceolato-impressum. Mesosternum haud carinatum.*

Le genre *Meligethinus* vient se placer entre les genres *Pria* et *Meligethes*; il est rapproché du premier par la structure de son labre et de ses antennes, et du second par la présence de fossettes sur la partie inférieure du dernier segment de l'abdomen.

M. humeralis, nov. sp. — *Oblongo-ovatus, modice convexus, nitidulus, tenuiter flavo-pubescent, fulvus, elytris juxta suturam et ad apicem infuscatis; capite deuse punctulato, depresso, antice biimpresso, prothorace transverso, antice angustato, quam capite minus dense sed fortius punctulato, margine antico parum emarginato, lateribus arcuatis, marginatis, basi truncata; scutello subtriangulari, apice hebetato; elytris elongatis, ad apicem attenuatis, subtruncatis densissime tenuiterque punctulatis, ultimum segmentum abdominis non obtegentibus, hoc acuminato densissime punctulato.* — Long. : 2 mill.

Oblong, acuminé vers l'extrémité de l'abdomen, très faiblement convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence flave, dense, fine et couchée, roux jaunâtre, avec la suture et l'extrémité des élytres enfumées. Tête transversale, déprimée, densément et finement pointillée, bi-impressionnée en avant; épistome saillant, subtronqué au sommet, côtés parallèles, subéchanérés. Prothorax à peine rétréci à la base, plus fortement au sommet, environ une fois moins long que large dans sa plus grande largeur; sommet largement et peu profondément échanéré; côtés arrondis, rebordés, à peine sinués contre la base; celle-ci subtronquée; ponctuation plus dense et plus fine que celle de la tête; écusson un peu transversal, en triangle faiblement

curviligne, émoussé au sommet; élytres atténués vers le sommet, environ une fois et demie aussi longs que larges dans leur plus grande largeur, arrondis, faiblement explanés sur les côtés, subtrouqués au sommet, très finement et très densément pointillés, laissant à découvert le dernier segment de l'abdomen. Ce dernier subtriangulaire, convexe, densément pointillé; marge apicale de l'avant-dernier segment présentant dans le milieu une saillie anguleuse. Tibias antérieurs finement dentés, avec deux dents un peu plus fortes, non contiguës, vers l'extrémité.

Angola (collection du British Museum).

Description d'un *Blattivorus* nouveau de Madagascar [COL.]

par le Dr A. CHOBOUT.

Blattivorus madagascariensis, nov. sp. — ♂. D'un noir de poix plus ou moins foncé. Partout recouvert, sauf sur les ailes, d'une pilosité courte, dressée, d'un gris obscur. Forme allongée. Tête subquadrangulaire, plus longue que large, avec sa plus grande largeur (1) un peu en arrière du milieu; à angles postérieurs bien marqués, droits; à peu près lisse, luisante en arrière des yeux, mate, d'un aspect velouté en avant de ceux-ci. Yeux très développés en dessus et en dessous, occupant plus de la moitié de la face supérieure de la tête, n'atteignant pas en avant le bord antérieur, séparés sur la ligne médiane par un profond et étroit sillon à fond lisse; d'abord contigus, puis leur bord postérieur commun formant un angle aigu, un peu moins ouvert que l'angle droit; composés d'ommatidies fines en avant, grossières en arrière, avec une assez longue pubescence noire, dressée, intercalaire. Antennes dépassant à peine le milieu du prothorax, de 10 articles, les 7 derniers munis, sur leur bord interne, d'une lamelle dilatée vers l'extrémité, épaisse, noire, rugueuse en haut, fine, transparente, grenue en bas : 1^{er} article cupuliforme, beaucoup plus développé en dedans qu'en dehors, en sorte que son extrémité regarde en avant et en dehors; 2^e environ trois fois plus large que long, comme embrassé par le précédent; 3^e encore plus large que le 2^e, aigu en dedans, embrassant la base du 4^e. Pronotum de 1,5 environ plus long que large à la base, en forme de cône tronqué, aminci en avant, très légè-

(1) Y compris les yeux.